

# Dermatite atópica

Dr. Roberto Souza Lima

# Dr. Roberto Souza Lima



CRM 21150–MG | RQE:35600

- Especialista em Alergia e Imunologia, mestre em Medicina pela Santa Casa de BH / UFMG
- Coordenador do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital Orizonti em BH
- Médico do Serviço de Alergia e Imunologia da Rede Mater Dei de Saúde
- Membro do Departamento de Dermatite Atópica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).
- Membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, da Academia Americana de Asma, Alergia e Imunologia, do Colégio Americano de Asma, Alergia e Imunologia e da Academia Européia de Alergia e Imunologia Clínica.

@robertosouzalima

31-99921-6436

Roberto Souza Lima



## Marcha Atópica

Progressão sequencial de condições alérgicas diferentes observada a partir dos primeiros anos de vida


# Panorama da Doença na Criança e no Adulto

**A DA moderada a grave está associada a maior risco de asma e crises com hospitalizações em comparação a população em geral**

Estudo de coorte do banco de dados THIN do Reino Unido

## Crianças com DA moderada a grave (n=27.753)\*

**Risco aumentado de asma**  
em comparação com crianças sem DA  
(N=1.809.029)



DA moderada  
**HR 3.24** (95% IC: 3,13–3,35)  
DA grave  
**HR 3.70** (95% IC: 3,50–3,92)

**Aumento do risco de hospitalizações relacionadas à asma**  
em comparação com crianças com asma, mas sem DA  
(n=169.679)



DA moderada  
**HR 2.63** (95% IC: 2,42–2,88)  
DA grave  
**HR 2.95** (95% IC: 2,54–3,42)

## Adultos com DA moderada a grave (n=214.216)\*

**Risco aumentado de asma**  
comparado com adultos sem DA (n=2.678.888)

DA moderada  
**HR 1.52** (95% IC: 1,48–1,55)  
DA grave  
**HR 1.58** (95% IC: 1,48–1,69)

**Aumento do risco de hospitalizações relacionadas à asma**  
em comparação com adultos com asma, mas sem DA  
(n=346.024)

DA moderada  
**HR 1.23** (95% IC: 1,18–1,29)  
DA grave  
**HR 1.44** (95% IC: 1,31–1,59)

**A magnitude dos riscos aumentou paralelamente à gravidade da DA;  
os pacientes com DA moderada a grave apresentaram o maior risco de asma incidente e exacerbação da asma**

Dermatit


A T Ó P I C A

e


“Uma doença traiçoeira. Pequenas lesões na pele não representam os grandes estragos internos !” (Roberto Souza Lima)

# Os Impactos na Vida dos Pacientes

## Prurido exacerbado/ciclo do arranhão




O prurido induzido pela DA e os resultados do coçar contribuem para complicações relacionadas à pele, como escoriação e infecção.




Sinais e sintomas da DA aumentam significativamente as consequências na qualidade, estilo de vida e economia.

# Carga Mental e Social dos Pacientes

# Children and Adolescents (0–17 Years) With AD Are at Increased Risk of Mental Health Disorders



## Impacto da Dermatite Atópica moderada a grave em adultos (n=380) conforme medida de DLQI na última semana<sup>1</sup>



# Os Impactos na Vida dos Pacientes

## Sintomas relatados pelos pacientes

(n=380)<sup>1</sup>

**FREQUÊNCIA DO PRURIDO**  
(POEM)



dos pacientes relataram prurido **todos os dias**

**GRAVIDADE DO PRURIDO**  
(Escala 5-D de prurido)

dos pacientes relataram prurido **“grave” ou “intolerável”**

**DISTÚRBIOS DO SONO**  
(POEM)



dos pacientes relataram distúrbios do sono **≥5 noites/semana**

**DURAÇÃO DO PRURIDO**  
(Escala 5-D de prurido)



dos pacientes **prurido** com duração **≥18 horas/dia**


# Distúrbios do Sono na DA moderada / grave

Pacientes com DA moderada a grave perdem


**~67**

noites de sono, por ano, durante um período de crise

Número de noites de sono afetadas durante crise



Número de vezes em que o paciente acorda durante a noite em período de crise



Dermatite

Atópica


Tratamento

## DERMATITE ATÓPICA no Brasil: Múltiplos tratamentos sub-ótimos<sup>1</sup>


Para pacientes com diagnóstico de DA **GRAVE**, 5 ou mais tratamentos foram relatados em **82%** para esta subpopulação

1. Mesquita K et al. J Bras Econ Saúde 2019;11(2):153-60.

### Tratamentos DA e gravidade



# Objetivos Terapêuticos



## Como alcançar os objetivos?

1º. Conhecer a doença

2º. Fatores causadores e agravantes


3º. Adesão da família

4º. Apoio do médico nas crises

5º. Explicar cada etapa e sua importância

6º. Tratamento intercrise (permanente)

# Opções Atuais para a DA leve / moderada / grave



; 1. Bula Baricitinibe disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Olumiant>; <sup>a</sup>Approved by the EMA but not all health authorities; AD, atopic dermatitis; European Medicines Agency; JAK, Janus kinase; TCI, topical calcineurin inhibitor; TCS, topical corticosteroid

@robertosouzalima

robertoslalergia@hotmail.com

31-99921-6436

Roberto Souza Lima

**Alergia e Imunologia**